suva

Cosa fare in caso di contatto

Misure da adottare dopo un'esposizione a sangue e ad altri liquidi biologici che lo contengono

Misure immediate

Ferite da puntura e da taglio, graffi, morsi
- Lavare accuratamente la ferita con acqua e sapone
- Disinfettare; ad es. con alcol al 70 %

Spruzzi sulle mucose (bocca, naso, occhi)
- Sciacquare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica

Contatto con la pelle lesa (ulcerazioni, esantemi ecc.)
- Lavare accuratamente con acqua e sapone
- Disinfettare; ad es. con alcol al 70 %

Notifica immediata

Ai superiori
Al medico competente (servizio medico del personale; pronto soccorso)

- Giorno: .....
- Notte / Fine settimana: .....

Misure mediche immediate

Il medico curante prenderà le seguenti misure:
- Accertamento del rischio d'infezione
- Se indicato, inizio immediato (entro 4 ore) di una profilassi postesposizione per l'HIV
- Controllo dello stato vaccinale contro l'epatite B
- Determinazione della concentrazione di anticorpi (HIV, epatite B e C)
- Eventuale continuazione dell'HIV-PPE, somministrazione di immunoglobuline anti-epatite B o vaccinazione di richiamo

Occorre intervenire subito

Ulteriori informazioni
- Verhütung blutübertragbarer Infektionen im Gesundheitswesen (Prevenzione delle malattie infettive trasmesse per via ematica nel settore sanitario; disponibile solo in DE e FR): www.suva.ch/2869-30.d
- Raccomandazioni attuali dell'UFSP per il personale sanitario in merito alle procedure da intraprendere a seguito dell'esposizione a sangue o ad altri liquidi biologici

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziato dalla CFSL
www.cfsl.ch

Suva
Casella postale, 6002 Lucerna
Tel. 058 411 12 12

Codice 2865.i
Stato: settembre 2024
Download: www.suva.ch/2865.i