

Un ago mi ha punto!

Misure da prendere dopo esposizioni a sangue e altri liquidi organici

Misure immediate

Ferite da punta e da taglio, graffi, morsi

- Lavare con acqua e sapone
- Disinfettare, ad es. con alcol al 70%

Spruzzi sulle mucose (bocca, naso, occhi)

- Sciacquare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica

Contatto con pelle lesa (ulcerazioni, esantemi ecc.)

- Lavare con acqua e sapone
 - Disinfettare, ad es. con alcol al 70%
-

Annuncio immediato

Ai superiori

Al medico competente (servizio medico del personale/pronto soccorso)

- giorno:
 - notte/finesettimana:
-

Misure mediche immediate

Il medico competente adotterà immediatamente le seguenti misure:

- accertare il rischio d'infezione
 - secondo la situazione, iniziare immediatamente una profilassi postesposizione HIV
 - controllare lo stato di vaccinazione contro l'epatite B
 - determinare gli anticorpi (HIV, epatite B e C), ev. transaminasi
 - proseguire eventualmente la profilassi postesposizione HIV e somministrare iperimmunoglobulina anti-epatite B o eseguire una vaccinazione di richiamo per l'epatite B.
-

Non perdetevi tempo!

Centri di riferimento per le infezioni trasmesse per via ematica in ambito sanitario:
CHUV Losanna/Ospedale universitario Zurigo

Altre informazioni:

Prevenzione delle malattie infettive trasmesse per via ematica in ambito sanitario,
www.suva.ch/2869-30.i

Informazioni telefoniche:

Centre de référence pour les infections transmissibles par le sang en milieu professionnel,
CHUV Losanna, tel. 021 314 02 75